



**MEDIZINISCHES
VERSORGUNGSZENTRUM
ST. COSMAS**

ÄRZTLICHE LEITER:
PROF. DR. MED.
RUDOLF BECKER-CASADEMONT
DR. MED.
CHRISTOPH COENEN
DR. MED.
THORSTEN TRUMM

ABTEILUNG
GASTROENTEROLOGIE

**DR. MED.
CHRISTOPH COENEN**
FACHARZT FÜR
INNERE MEDIZIN
DIAGNOSTISCHE UND
OPERATIVE ENDOSKOPIE
- ALLE KASSEN -

**DR. MED.
THORSTEN TRUMM**
FACHARZT FÜR
INNERE MEDIZIN,
GASTROENTEROLOGIE,
NOTFALLMEDIZIN
- ALLE KASSEN -

RATHAUSPLATZ 1
D-85579 NEUBIBERG
TEL. o 89/68 09 84-o
FAX o 89/601 21 93

INFO@MVZ-ST-COSMAS.DE
WWW.MVZ-ST-COSMAS.DE

**KOLO-ILEOSKOPIE
ÖSOPHAGO-GASTRO-
DUODENOSKOPIE
KAPSELENDOSKOPIE
POLYPEKTOMIE
SONOGRAPHIE
- ABDOMEN
- SCHILDDRÜSE
H₂-ATEMTEST**

Infoblatt H₂-Atemtest

Die Durchführung eines H₂-Atemtestes zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Dünndarmes setzt für ein aussagekräftiges Ergebnis folgende Regeln voraus:

1. Vorbereitung

- Der zeitliche Abstand zu einer Dickdarm-Spiegelung sollte mindestens 10 Tage betragen.
- Der zeitliche Abstand zu einer Antibiotika-Therapie sollte mindestens 10 Tage betragen.
- 3 Tage vor der Untersuchung sollten motilitätsfördernde oder motilitätshemmende Medikamente abgesetzt werden (z. B. Motilium, Imodium, MCP, Paspertin usw.)
- Einen Tag vor der Untersuchung sollten Sie keine Milch, Milchprodukte und Obstsaft zu sich nehmen,
- am Vortag keine Abführmittel, besonders nicht Lactulose einnehmen,
- am Vorabend der Untersuchung bitte keine Aufnahme von kohlenhydratreichen (z.B. große Portion Nudeln), blähenden und ballaststoffreichen Speisen wie z.B. Salate, Gemüse (v.a. Zwiebeln, Lauch, Kohl, Kraut und Bohnen). Geeignete Abendmahlzeiten könnten beispielsweise sein: (Gemüse-)Brühe mit Nudeln, Gemüsesuppe (z.B. Kürbissuppe) ohne Milch, Sahne, Schmand oder Sauerrahm, Omelett (ohne Milch) mit Schinken, Reis/Kartoffeln mit gebratener Hähnchenbrust oder Fisch mit Karottengemüse.
- Rauchen Sie bitte 8 Stunden vor der Untersuchung nicht.
- Führen Sie bitte keine intensiven Abführmaßnahmen vor der Untersuchung durch.
- Halten Sie vorher eine Nüchternperiode (Nahrungsmittel) von 14 Stunden ein. Bis 5 Stunden vor dem Beginn der Untersuchung dürfen Sie Wasser trinken.

2. Verhalten während der Untersuchung

- Bitte rauchen Sie auch während der Durchführung der Untersuchung bis zur Beendigung nicht! Die Untersuchung dauert 2 bis 3 Stunden.
- Während des Testverlaufs dürfen Sie keine Speisen und Getränke zu sich nehmen.

